

NL **SmithNephew**
IODOSORB® OINTMENT
 Cadexomerzalf (49,1% gewicht/gewicht) met jodium

Omschrijving
 IODOSORB®-zalf is een steriele donkerbruine zalf, die bestaat uit cadexomeer (gemodificeerde zetmeelmecroplakor), polyethyleenglycol, poloxamer en jodium. De cadexomeerpartieer is biologisch afbreekbaar. IODOSORB-zalf absorbeert overduidelijk exsudaat en vult van het wondbed en doodt bacteriën op het wondoppervlak. Hierdoor verandert het in een zachte, vochtige gel.

Indicaties
 IODOSORB-zalf is geadecoreerd voor topische behandeling van chronisch niet-ontstekingssijnde zoals venese beenulcera, diabetesche voetslaes en decubitus.

IODOSORB-zalf kan bij compressietherapie worden gebruikt. IODOSORB-zalf kan worden gebruikt op geïnfecteerde wonden. Als het product wordt gebruikt op geïnfecteerde wonden, moet de infectie worden gesignaleerd en behandeld volgens het ter plaatse geldend klinisch protocol.

Bestanddelen
 IODOSORB-zalf mag niet worden gebruikt op droog necrotisch weefsel of bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor jodium of een van de andere componenten. Gebruik IODOSORB-zalf niet bij kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven of patiënten met schilddruesziekten (zie ook de toelichting van Hashimoto of niet-toxische nodulaire struma).

Waarschuwingen
 Er bestaat een mogelijk risico op interactie met lithium. Het is niet aan te raden om IODOSORB-zalf te gebruiken op patiënten met een bekende overgevoeligheid voor jodium of een van de andere componenten. Gebruik IODOSORB-zalf niet gelijktijdig met mercuriële antiseptica of taurolidine. Als de patiënt op het punt staat een antibioticakuur te ondergaan, moet hij/zij de zorgverlener hiervan op de hoogte stellen.

Zorgvoorsmaatregelen
 De maximale dosis van het product moet in acht worden genomen. Patiënten met een ernstige toornissen of patiënten bij wie als gevolg van jodium schildkliercomplicaties kunnen ontstaan, moet hiervoor aandacht worden besteed aan het gebruik met name bij de behandeling van grote wonden of bij langdurig gebruik.

IODOSORB-zalf is uitsluitend voor gebruik bij één patiënt en mag niet worden hergebruikt omdat er dan kruisbesmetting of infectie kan optreden en de zalf effectief kan worden. • Het inhoud van de tube mag slechts bij één patiënt worden gebruikt. • Gebruik IODOSORB-zalf niet in de nabijheid van de ogen, een neus of een open wond. • Het product is uitsluitend bestemd voor uwendig gebruik.

• IODOSORB-zalf kan lichte pijn van tijdelijke aard veroorzaken, vooral in het eerste uur na de behandeling. Dit is een teken dat het product de wond begint te reinigen. Soms kan door IODOSORB-zalf de huid rond de wond rood worden of zwelt op. Dit wordt niet geacht meestaal over. Als deze symptomen aanhouden of als de patiënt andere symptomen ondervindt, moet hij/zij contact opnemen met de zorgverlener.

• Contact met de huid rond de wondranden/intacte huid moet tot een minimum worden beperkt.

• Het is mogelijk dat een klein klevend kerst op de huid als IODOSORB-zalf uitdroogt.

• Een enkele toepassing van IODOSORB-zalf mag niet meer dan 50 g (odopovládá 5 tuberkon 10 g) en in een week mag niet meer dan 150 g (equivalent aan 15 tubes van 10 g) worden aangebracht.

• De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 3 maanden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgverleners.

Gebruiksaanwijzing
 Bewaar de tube in de verpakkingsoods.

IODOSORB-zalf aanbrengen
 1. Was handen grondig wassen voor en na gebruik.

Gebruik handschoenen (niet-steriele) die u niet met omringende gebied te reinigen met een zachte stroom water of een zoutoplossing. Het wondoppervlak NIET DROEGEN.

2. Breng voldoende IODOSORB-zalf aan op een steriel kompres om een laag te vormen die 3 mm diep is en zich aanpast aan de vorm van de wond.

Plaats het met IODOSORB-zalf bedekte kompres op de wond. Als alternatief kunt u IODOSORB-zalf op de wond aanbrengen en met een gehandschoende vinger direct plaats strijken, naar de vorm van de wond en met een dikte van 3 mm.

3. Bedek de wond volledig met een geschikt secundair verband.

4. Breng indien nodig een drukverband aan. Na het aanbrengen moet de resterende inhoud van de tube worden weggegooid vanwege verlies van steriliteit.

IODOSORB-zalf verwijderen
 1. IODOSORB-zalf moet worden verwijsteld wanneer het verzadigd is met exsudaat en al het jodium is vrijgegeven. Dit wordt aangegeven door kleurverlies, meestal twee tot drie keer per week. Als de wond veel exsudaat, kan het nodig zijn om dagelijks te vervangen. Als de IODOSORB-zalf niet verzadigd raakt door exsudaat, is dit niet nodig. Het is niet nodig te vervisselen 3 dagen. Laat het kompres zo nodig enkele minuten weken, verwijder het vervelgens, verwijder de IODOSORB-zalf met behulp van behulp van een stroom water of zoutoplossing.

3. Dep overtollig vocht voorzichtig en laat het wondoppervlak enigszins drogen, voordat u opnieuw IODOSORB-zalf aanbrengt.

4. Voer het product als afval op volgens plaatselijke klinische protocollen, of geef het op hygienische wijze weg na gebruik.

Als u van mening bent dat er tijdens het gebruik van de hulpmiddel een ernstig incident heeft plaatsgevonden, rapporteer dit dan bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten.

Complaints=Smith-Nephew.com Een kopie van de samenvatting van de veiligheids- en informatie preses: (SCSP) beschikbaar via https://ec.europa.eu/tools/euadmed

Bezoekbaarheid van het product
 66001297 2 x 20 g
 66001298 4 x 10 g
 66001299 1 x 40 g

*Handelsmerk van Smith-Nephew Datum van uitgifte 01/2025. Herziening 01. Dit product kan onder een of meer Amerikaanse (VS) octrooien vallen. www.smith-nephew.com/patents

PL **SmithNephew**
IODOSORB® OINTMENT
 Maść kadexomerowa (49,1% wag./wag.) z jodyną

Opis
 Maść IODOSORB® to jათვა, ძიემნობჯავა maść zawierająca kadexomer (modyfikacja skrobi modyfikowane), glikol polietylenowy, poloksamer i jod. Mikrogranulat kadexomerulega biodegradacji. Maść IODOSORB pochłania nadmierny wysięk, martwicę zapalniczą z łożyska rany oraz wyszczy bakterie na jej powierzchni.

W trakcie tego procesu opratunki te przekształcają się w miękki, wilgotny żel.

Wskazania
 Maść IODOSORB® jest wskazana do miejscowego leczenia przewlekłych ran, w tym ciężkich, takich jak oparzenia 2 i 3 stopnia, trudno gojące się, owrzodzenia stopy cukrzycowej i urazy spowodowane uciskiem. Maść IODOSORB® może być stosowana w terapii uszkiełkowej.

Maść IODOSORB® może być stosowana na zakazane rany. W przypadku stosowania produktu na zakazane rany zakazane należy kontrolować i leczyć zgodnie z lokalnym protokołem klinicznym.

Przeciwwskazania
 Maść IODOSORB® nie należy stosować na składa tkankę martwiczą, ani u pacjentów z zezwierżoną wrażliwością na jod lub kationy jodu w pozostałych składnikach. Nie należy stosować maści IODOSORB® u dzieci, kobiet w ciąży lub karmiących, ani u pacjentów z zaburzeniami czynności tarczycy (np. zapalenie tarczycy typu Hashimoto lub nietoksyczna węzłowa guzka).

Ostrzeżenia
 Istnieje potencjalne ryzyko interakcji z litem, powiększając zwiększone prawdopodobieństwo niedoczynności tarczycy.

Nie stosować maści IODOSORB® jednocześnie z innymi środkami antyseptycznymi lub taurolidyną. Jeśli pacjent ma poddać się badaniu czynności tarczycy, powinien poinformować o tym pracownika służby zdrowia.

Środki ostrożności podczas stosowania
 Należy przestrzegać maksymalnej dawki produktu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów, u których mogły wystąpić powikłania związane z tarczycą w związku z jodem, szczególnie w przypadku leczenia dużych ran lub w trakcie długotrwałego stosowania.

• Maść IODOSORB® służy do leczenia i jednego pacjenta i nie należy jej używać ponownie, ponieważ może dojść do zakazania krzyżowego lub infekcji. Maść może okazać się nieskuteczna.

• Zawartość tubki należy stosować wyłącznie u jednego pacjenta.

• Nie stosować maści IODOSORB® w okolicach oczu, uszu, nosa lub ust.

• Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

• Maść IODOSORB® może powodować niewielki przyciemny ból w ciągu pierwszych godzin po rozpoczęciu leczenia. Oznacza to, że produkt zaczyna oczyszczać ranę. Czasami maść IODOSORB® może powodować obrzęk lub zaczerwienienie wokół brzozyw rany. Te objawy zwykle ustępują. Jeśli te objawy nie ustępują lub jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek inne objawy, należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

• Należy zminimalizować kontakt ze skórą wokół brzozyw rany/nieuzdanej skóry.

• Możliwe jest powstanie przylegającego strupa, jeśli maść IODOSORB® zostanie pozostawiona na wyschnięcia.

• Jednorazowe zastosowanie maści IODOSORB® nie powinno przekraczać 50 g (co odpowiada 5 tubkom po 10 g) i nie więcej niż 150 g (co odpowiada 15 tubkom po 10 g) w ciągu jednego tygodnia.

• Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 3 miesięcy.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez pracowników służby zdrowia.

Instrukcja użycia
 Tubkę należy przechowywać w kartonie zewnętrzny.

Nakładanie maści IODOSORB
 1. Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu. Używając rękawiczek, oczyścić ranę i okolice zainfekowanego strumieniem wody lub roztworu soli fizjologicznej. NIE OSUSZAJ powierzchni rany.

2. Należy odpowiednio iśćle maść IODOSORB® na ranę, która dopasuje się do kształtu rany. Należy użyć ostrożności pokryty maścią IODOSORB® na ranę. Alternatywnie należy użyć rękawiczek i ranę i wyglądać na miejsce palców w rekwizycie do kształtu rany i grubości warstwy maści 3 mm.

3. Okończone zabiegi rany odpowiednim opakowaniem wtęrnym.

4. W razie potrzeby zastosować bandaż uciskowy. Po aplikacji pozostają zawartość tubki należy wyrzucić ze względu na utratę sterylności.

Zmiana maści IODOSORB
 1. Maść IODOSORB® należy zmieniać, gdy zostanie całkowicie wyschnięta z rany i uwalniony zostanie cały jod. Wskazuje na to żółty osad, zwykle dwa do trzech razy w tygodniu. Jeśli wysięk z rany jest bardzo duży, mogą być potrzebne codzienne zmiany opatrunku. Jeśli maść IODOSORB® nie zostanie nasyczona wysiękiem, maksymalny czas między zmianami wynosi 3 dni. Jeśli to konieczne, należy nasycający opatrunka naka kilka minut, a następnie go usunąć.

2. Delikatnie zdjąćnową maść IODOSORB® pod strumieniem wody lub roztworu soli fizjologicznej.

3. Przed ponownym założeniem maści IODOSORB® delikatnie zetrzeć nadmiar płynu, pozostawiając lekko jodową powierzchnię rany.

4. Po użyciu IODOSORB® należy użyć z lokalnymi protokołami klinicznymi lub wyrzucić w sposób higieniczny.

5. Zgodnie z wytycznymi tego wyrobu należy dotrzeć do powojnego leczenia, nowego by zgłosić to producentowi i właściwemu organowi.

Complaints=Smith-Nephew.com

• Copie a rezumatului caracteristicilor de siguranță și de performanță clinică (SCSP) este disponibilă la https://ec.europa.eu/tools/euadmed

Dostępność produktu
 66001297 2 x 20 g
 66001298 4 x 10 g
 66001299 1 x 40 g

*Znak towarowy firmy Smith-Nephew Data wydania 01/2025. Rewizja 01. Ten produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem amerykańskim. www.smith-nephew.com/patents

DK **SmithNephew**
IODOSORB® OINTMENT
 Cadexomer-salve (49,1 % w/w) med iod

Beskrivelse
 IODOSORB®-salven er en sterilt, mørkebrun salve bestående af cadexomer (modificerede stivelsesmikroporler), polyethylenglycol, poloxamer og iod. Cadexomer-partiene er biologisk nedbrydbare. IODOSORB-salven vil absorbere overskydende eksudat og dødt væv fra sårbunden og dræbe bakterier ved såroverfladen.

På denne måde omvandles det i et blødt fugtigt gel.

Indikationer
 IODOSORB-salven er indiceret til topisk behandling af kroniske eksuderende sår, som f.eks. venese bensår, diabeteske fotsår og trykksår.

IODOSORB-salven kan anvendes under kompressionsbehandling.

IODOSORB-salven kan anvendes på inficerede sår. Når produktet anvendes på inficerede sår, skal infektionen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Kontraindikationer
 IODOSORB-salve må ikke anvendes på tørt nekrotisk væv på patientens sår, og den må ikke anvendes før for eller efter rengøring som behst af de andre komponenter.

Brug ikke IODOSORB-salve på børn, gravide eller ammende kvinder eller patienter med thyreoideasjukdom (se også Hashimotos thyreoidit eller ikke-toxisk knudestruma).

Advarsler
 Det er en potentielt risiko for interaktion med lithium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved behandling av store sår eller ved langvarig bruk.

IODOSORB-salven kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, skal infeksjonen også behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Advarsler
 Det er en potensielt risiko for interaksjon med litium, noe som gir et mulighet for hypotyrose.

Det er også mulig at det kan være en risiko for hypothyreoidisme.

Brug ikke IODOSORB-salve samtidig med kvikksølvbaserede antiseptiske midler eller taurolidin. Hvis patienten får antibiotika, må de ikke brukes samtidig med IODOSORB-salven.

Forholdsregler for bruk
 Maksimal dose av produktet må overholdes. Vær spesielt forsiktig ved bruk på pasienter med nedsatt funksjon av skjoldkirtelen, spesielt ved bruk av komplikasjoner i skjoldkirtelkjertelen på grunn av jod, spesielt ved